

Số: 34.../CT-BVNTW

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện tiêu chuẩn nhập viện, chuyển tuyến và ra viện đối với người bệnh nhiễm RSV hô hấp

Để thống nhất việc tiếp nhận, điều trị và chuyển tuyến người bệnh nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) tại Bệnh viện Nhi Trung ương; đồng thời bảo đảm hiệu quả điều trị và sử dụng hợp lý nguồn lực y tế, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn nhập viện

Trẻ được chỉ định nhập viện khi có một trong các biểu hiện:

- Trẻ có suy hô hấp hoặc nguy cơ suy hô hấp: thở nhanh so với tuổi, co kéo cơ hô hấp rõ (rút lõm lồng ngực, rút lõm hõm trên ức, phập phồng cánh mũi, đầu gật gù theo nhịp thở...), tiếng thở bất thường (rít thanh quản khi nằm yên, thở rên, khò khè rõ), cơn ngừng thở, $SpO_2 < 94\%$.

- Có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân: ăn rất kém/bỏ ăn, nôn tất cả mọi thứ, lì bì, co giật.

- Dấu hiệu nhiễm trùng – nhiễm độc nặng: sốt cao liên tục không hạ, da tái ẩm, mệt mỏi nhiều, chỉ số viêm không đặc hiệu tăng cao.

- Trẻ có yếu tố nguy cơ nặng: trẻ < 2 tháng tuổi, đẻ non, suy dinh dưỡng nặng, bệnh phổi mạn, bất thường đường thở, suy giảm miễn dịch, bệnh tim bẩm sinh, bệnh lý thần kinh cơ...

- Tổn thương phổi nặng trên chẩn đoán hình ảnh: ứ khí nặng 2 phổi, xẹp phổi, tổn thương đông đặc lan tỏa nhiều thùy phổi, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, viêm phổi hoại tử.

2. Tiêu chuẩn chuyển tuyến dưới

Trẻ được chuyển tuyến khi có các tiêu chuẩn sau:

- Trẻ không có nguy cơ suy hô hấp: không thở gắng sức, $SpO_2 \geq 94\%$ (đo tại thời điểm khám và trước khi chuyển tuyến).

- Không có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân: trẻ tỉnh, ăn được, không nôn tất cả mọi thứ, không co giật.



- Không có dấu hiệu nhiễm trùng – nhiễm độc nặng.
- Không có các yếu tố nguy cơ nặng.
- Không có tổn thương phổi nặng trên chẩn đoán hình ảnh (xem phần tiêu chuẩn nhập viện).

3. Tiêu chuẩn ra viện

Trẻ được ra viện khi có các tiêu chuẩn sau:

- Trẻ không suy hô hấp.
- Không khó thở hoặc khó thở mức độ nhẹ.
- Không sốt.
- Ăn tốt bằng đường miệng.
- Có thể chuyển thuốc đường uống tại nhà.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung trên. *luu*

Nơi nhận:

- Các khoa/phòng/trung tâm;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT; KHTH. (01)

